




## Erste Hilfe Maßnahmen bei festsitzenden Apparaturen

Auch eine kieferorthopädische Apparatur kann einmal kaputt gehen und dann stören oder sogar Beschwerden verursachen.

**Vereinbare dann umgehend einen Termin bei Deinem Kieferorthopäden.**

Bis dahin kann man sich oft selbst helfen:



Schmerzen

Wurde die Apparatur oder ein neuer Bogen eingesetzt, können vorübergehend Schmerzen auftreten. Nimm evtl. eine leichte Schmerztablette.

Bracket oder Band lose,  
keine Schmerzen

Hat sich ein Bracket oder Band (Metallring) vom Zahn gelöst und hängt aber noch am Bogen, so belasse alles wie es ist und vereinbare einen Rep.-Termin bei uns..

**ACHTUNG: bis zur nächsten Kontrolle nicht mehr mit elmex Gelée putzen!!**

Hat sich ein Band vom Zahn gelöst, versuche den Zahn mit der Zahnbürste zu reinigen und das Band wieder auf den Zahn zurückzuschieben.

Hat sich ein Bracket/Band ganz gelöst und es besteht keine Verbindung mehr zu einem Bogen, so versuche das Teil vorsichtig zu entfernen. Bewahre es bitte auf und bringe es zum schnell vereinbarten Termin mit.

|  |   |
|--|---|
| Drähtchenende (Ligatur) sticht   | Beim Essen bzw. Zähneputzen kann sich das Ende eines Drähtchens verbiegen und sticht dann evtl. in die Lippe. Mit der Rückseite eines Bleistiftes oder dem Löffelstiel kann es einfach zum Zahn angebogen werden. Zusätzlich evtl. mit Wachs abdecken.  |
| Gelöster Bogen   | Versuche dann den Bogen mit einer Pinzette wieder in das Bracket oder Band einzusetzen. Bei Bedarf mit etwas Wachs das Bogenende verkleben.   |
| Störende Bogenenden  | <b>ACHTUNG: Von der Benutzung von Seitenschneidern oder anderem Werkzeug in der Mundhöhle wird dringend abgeraten! Abspringende Drahtenden könnten zu Weichteilverletzungen führen!</b><br><br>Versuche vorsichtig, das Bogenende mit einem Löffelstiel oder dem Radiergummi eines Bleistiftendes umzubiegen bzw. anzudrücken. Klebe etwas Schutzwachs auf das Bogenende. |
| Festsitzende Apparatur im Bereich des Gaumens oder der Zunge hat sich gelöst | Hat sich ein Band gelöst, an dem der Innenbogen befestigt ist, versuche das Band wieder auf den Zahn zurückzuschieben. Die Apparatur dürfte dann nicht mehr stören.<br><br>Sollte im Unterkiefer der Innenbogen gebrochen sein, bitte sofort einen Termin vereinbaren, um den Innenbogen entfernen zu lassen.   |
| Verlorene Drähtchen (Ligatur) oder Gummiringe                                | Teile es dem Kieferorthopäden beim nächsten Termin mit.   |
| Wunde Stellen  | Bei wunden Stellen kann mit Kamillosan gespült werden. Spangenbergbereich evtl. mit Wachs abdecken.<br>Bei Einlagerungen der Zahnspange in die Schleimhaut sofort einen Termin vereinbaren.   |
| Zahnfleischentzündungen  | Zahnfleischentzündungen und Bluten beim Putzen sind in der Regel auf mangelhafte Zahn- und Mundpflege zurückzuführen. Putze die Zähne einschließlich Zahnfleisch nach jedem Essen.  |

Gesellschafter:  
Dipl. Stom. Heike Schneider (ärztliche Leitung)  
Alexander Schmidt  
Dr. Christoph Schmidt  
Sebastian Schiewe

Mo. 08:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00  
Di. 08:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00  
Mi. 08:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00  
Do. 08:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00  
Fr. nach Vereinbarung

Besuchen Sie unsere Webpage:

[www.kieferorthopaedie-brilon.de](http://www.kieferorthopaedie-brilon.de)